

Klinik, avdeln

Sida

Pat-ID

# INTRAVENÖST INSULIN - Operation

Datum

## INSULIN:

Fasta, i.v. vätska och i.v. insulin från kvällen före op. eller op-dagens morgon.

100E (=1ml) snabbinsulin (Actrapid) blandas i 100 ml 0,9% NaCl-lösning, vilket ger 1E/ml, som ges intravenöst med sprut-pump.

## VÄTSKA:

5% Glukos med 40 mmol Na/l och 20 mmol K/l.


Ge 3 ml/kg/tim och dosera insulin enligt nomogrammet.

Fortsatt operativ vätske-behandling enligt narkosläkarens ordinationer.

## BLODSOCKER:

Måste tas varje timma, även på natten!

B-glukos, mmol/l



Vikt ..... kg

I.v. insulin E/kg/tim

Räkna ut E/tim efter vikten

Sign läk .....

## HYPOGLYKEMI:

Vid blodsocker < 3,5 mmol/l stäng av insulinet i högst 10 - 15 min, dosera sedan enligt blodsockersvar.

## AVSLUTNING:

Ge ordinarie dos snabbverkande insulin till maten när barnet kan äta. I.v. insulinet avslutas först 2 timmar senare. Dosera i.v. insulin enligt nomogrammet även under dessa 2 tim.



## NOLLSTÄLLNING:

Nollställ pumpen varje morgon kl 08 och läs av given mängd insulin totalt under dygnet:

..... E från kl ..... till kl .....

B-glukos, mmol/l

U-glukos



Sign sjuksköt.

Ketoner